



Fase Vegetativa	Parassiti	Prodotti	Dosi per HI	Carenza	Note e raccomandazioni
Caduta Foglie	Cancri rameali	Poltiglia B .Disp.	kg. 1,2	20 gg.	In caso di attacchi gravi di Nectria si consiglia di eseguire due trattamenti; il primo a metà caduta foglie dimezzando la dose ed il secondo a completa caduta foglie a dose piena.
		<i>oppure</i> Iperion	kg. 0,6	20 gg.	
		<i>oppure</i> Microcopp FL	cc. 700	20 gg.	
Rottura Gemme	Ticchiolatura e Cancri rameali	Poltiglia B .Disp. <i>oppure</i> Iperion <i>oppure</i> Microcopp FL	kg. 1,2 kg. 0,6 cc. 700	20 gg. 20 gg. 20 gg.	
Da rottura gemme a mazzetti affioranti	Ticchiolatura	Delan	gr. 100	21 gg.	Tempi di assorbimento: Score: almeno 3-4 ore.
		<i>oppure</i> Penncozeb DG/ Polyram DF	gr. 200 gr. 200	28 gg. 28 gg.	
		Formulati ad azione retroattiva Score 25 EC/Bogard	cc. 15	14 gg.	
		Modalità di intervento. Mantenere protetta la vegetazione ogni 3-5 gg. (Delan o sim. ha una persistenza di 1 – 2 gg in più rispetto Penncozeb/Polyram) in funzione dell'accrescimento vegetativo, trattare preventivamente in previsione di piogge (basarsi sui bollettini meteo), utilizzare lo Score/Bogard qualora non si riesca ad intervenire in tempo utile. Eseguire i trattamenti con apparato folgiare asciutto, assicurandosi, in caso si utilizzi lo score, di rispettare il relativo periodo utile di assorbimento.			
Cocciniglia grigia (di S.Josè)		Applaud 40 SC	cc. 80	7 gg.	Con Applaud SC/Blekaut occorre eseguire una perfetta bagnatura, impiegando almeno 1,2 Kg. di prodotto per Ha. I prodotti sono impiegabili sino al 30 Marzo 2010.
		<i>oppure</i> Blekaut	gr. 150	7 gg.	
		+ Olio Bianco Vernoi/Eko Oil <i>oppure</i> Admiral 10 EC	lt. 2 lt. 1 cc. 40	20 gg. 20 gg. --	
Bottoni rossi	Afide grigio	Teppeki	gr. 14 (140 gr/ha)	21 gg.	
	Afide Lanigero	Epik 5 WP	gr.100 (1,5 kg./Ha)	14 gg.	
	Tortricidi ricamatori	Prodigy	cc. 40	14 gg.	Il trattamento sulla generazione svernante non sempre è risolutivo.
		<i>oppure</i> Steward Avaunt EC	gr. 16,5 cc. 33	7 gg. 7 gg.	
Avaunt è la nuova formulazione di Steward.					
Prefioritura	Oidio	Topas 200 EW	cc. 20	14 gg.	
		<i>oppure</i> Atemi 10 Pepite	gr. 20	7 gg.	
Inizio Fioritura	Carpocapsa: Attenzione: per rafforzare la difesa chimica riteniamo fortemente consigliato, l'installazione degli erogatori per la confusione sessuale.				

Fase Vegetativa	Parassiti	Prodotti	Dosi per HI	Carenza	Note e raccomandazioni	
Inizio Fioritura	Carpocapsa	Check Mate CMXL	N° 300-450 /Ha	--		
		<i>oppure</i> Rak 3	N° 900-1000/Ha	--		
Caduta petali	Afide grigio Cemiosoma	Confidor Oteq	cc. 50	28 gg.	Il Confidor deve essere impiegato una sola volta all'anno.	
		<i>oppure</i> Isomate C Plus	N° 1000/Ha	--		
Da inizio fioritura a frutto noce	Ticchiolatura	Nelle varietà Fuji, Golden, Gala, Pink Lady, sensibili al Mancozeb utilizzare Delan o Make UP 480 SC.				
	Carpocapsa 1° Generazione	1) Coragen	cc. 20 (300 cc./Ha)	14 gg.	Trattare a inizio deposizione uova. Valido anche su Pandemis.	
		2) Coragen	cc. 20 (300 cc./Ha)	14 gg.		
		3) Laser <i>oppure</i> Dursban 75 WG Alisè 75 WG <i>oppure</i> Madex/ Carpovirusine	cc. 30 gr. 70 gr. 70 gr. 20 cc. 100	7 gg. 30 gg. 30 gg. 3 gg. 3 gg.		
	Tutti i prodotti a base di Virus della Granulosa (Madex, Carpvirusine) e Laser necessitano l'acidificazione dell'acqua prima di immetterli in botte, quindi aggiungere all' acqua Control DMP cc. 100 / Ideal pH cc. 100 / Neutral cc. 100 / KSC Physio H cc. 20 / Starter Kel cc. 50 / Fertacid cc. 50-100 / Cifovir cc. 100, pH One cc. 100.					
	Litocollete	Laser <i>oppure</i> Vertimec + Break Thru	cc. 30 cc. 75 + cc. 100	7 gg. 28 gg. --	Trattare in pieno volo degli adulti.	
	Oidio	Thiopron + Atemi 10 Pepite <i>oppure</i> Thiocur forte	cc. 300-400 gr. 20 gr. 150	5 gg. 7 gg. 15 gg.		
	Eulia e Pandemis	Laser	cc. 30	7 gg.	Consultare il tecnico di zona per il posizionamento del trattamento. Per Eulia è fortemente consigliato installare trappole a feromoni entro la metà di aprile.	
Da frutto noce alla raccolta	Afide Verde e Nero	Pirimor + Reldan 22 <i>oppure</i> Teppeki	gr. 150+ cc. 150 gr. 14 (140/Ha)	14 gg. 15 gg. 21 gg.	Miscela attiva anche nei confronti dell'afide laniero; non impiegare su Pink Lady e Fuji.	

Fase Vegetativa	Parassiti	Prodotti	Dosi per HI	Carenza	Note e raccomandazioni	
Da frutto noce alla raccolta	Zeuzera	Nomolt <i>oppure</i> Alsystin SC	cc. 50 cc. 25	14 gg. 28 gg.	Occorre impiegare 800 gr./Ha di Nomolt. Impiegare Alsystin al massimo sino al 10 Settembre.	
	Carpocapsa 2° Generazione	1) Calypso 2) Affirm 3) Affirm <i>oppure</i> Dursban 75 WG Alisè 75 WG	cc. 25 gr. 300 gr. 300 gr. 70 gr. 70	14 gg. 7 gg. 7 gg. 30 gg. 30 gg.	Trattare ad inizio nascita larve. Con Affirm posizionare i trattamenti alla prima schiusura delle uova e ripetere dopo 7-10 gg. Affirm ha un'attività collaterale contro i fillominatori e tortrici ricamatori.	
	Ticchiolatura estiva	Make UP 480 SC/Merpan	cc. 250	21 gg.		
	Cocciniglia grigia	Reldan 22 / Etifos ME <i>oppure</i> Dursban 75 WG Alisè 75 WG	cc. 250 gr. 70 gr. 70	15 gg. 30 gg. 30 gg.	Sconsigliato su Pink Lady e Fuji. Trattamenti di soccorso non risolutivi.	
	Acari	Envjdor <i>oppure</i> Nexter <i>oppure</i> Acarion <i>oppure</i> Vertimec + Break Thru	cc. 40 cc. 75 cc. 150 cc. 100+ cc. 100	14 gg. 14 gg. 14 gg. 14 gg. --	Posizionare il trattamento alla comparsa delle prime forme mobili. Con Acarion ripetere il trattamento dopo 7-10 gg.	
	Carpocapsa 3° Generazione	Trebon star/Biensure <i>oppure</i> Calypso	cc. 100 cc. 25	7 gg. 14 gg.	Iniziare i trattamenti all'inizio di Agosto.	
	Per l'ottimale contenimento della cidia del pesco su pero è consigliabile la confusione sessuale con le stesse modalità previste per il pesco. In alternativa abbinare ai trattamenti sopra indicati la confusione spray (Check Mate OFM – F 50 ml / ettaro).					
	Mosca della frutta	Trebon Star	cc. 100	7 gg.		
	Gleosporium e altri marciumi di magazzino	Make UP 480 SC/Merpan <i>oppure</i> Bellis	cc. 250 gr. 55	21 gg. 7 gg.	Questi prodotti hanno attività collaterale anche nei confronti dell'alternaria.	

Fase Vegetativa	Parassiti	Prodotti	Dosi per HI	Carenza	Note e raccomandazioni
Ottobre	Carpocapsa (Larve svernanti)	Optinem Cidia	Una confezione per ettaro	--	Trattare nel mese di Ottobre con temperature non inferiori ai 10° ed in concomitanza di un evento piovoso, bagnare prevalentemente il tronco e la parte bassa della pianta con 15-20 HI per Ha. Accorgimenti per la corretta distribuzione con l'atomizzatore: a) togliere i filtri; b) usare ugelli con diametro minimo di 0,8 mm; c) usare max 5 – 6 atmosfere di pressione.

Avvertenze: Non impiegare formulati EC e prodotti a base di Mancozeb, su varietà del gruppo Fuji, Gala e Pink Lady.

Non intervenire con Zolfo, Dinocap, Dodina e Captano dopo trattamenti con Oli minerali se non sono trascorsi almeno 15 giorni dal trattamento a base di olio.

Sulle varietà Golden Delicious, Pink e Fuji, onde evitare la rugginosità dei frutti, impiegare contro la ticchiolatura delan o captano, mai dodina o sali di rame, e utilizzare sempre insetticidi o acaricidi in polvere bagnabile e mai miscele fra emulsioni e polveri bagnabili.

A salvaguardia delle api e degli altri pronubi non eseguire trattamenti con insetticidi durante la fioritura.