



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Nota Tecnica 19-04-2010

#### Albicocco

##### **Oidio con azione collaterale su apiognomonìa**

Indar cc. 100

##### **Oidio**

Microthiol Disperss gr. 300

##### **Batteriosi**

Bactime CU cc. 300 E' segnalata in numerosi impianti, la presenza di gommosi molto accentuate, di probabile origine batterica.

##### **Forficule**

Agri-col pennellare il tronco

##### **Ricamatori e falena con azione collaterale sui curculionidi**

Steward gr. 16,5

*oppure*

Avaunt cc. 33

Trattare in caso di infestazione

##### **Capnodio**

Calypso cc. 25

Segnalata la presenza in aziende solitamente infestate, in questi casi iniziare la difesa.

##### **Miridi**

Biensur oppure Trebon star cc. 100

In caso di infestazione

##### **Concimazione fogliare**

Miglioramento allegazione ed aumento pezzatura

Alga Vital cc. 150 oppure BM 86 cc. 250 Eseguire due interventi uno a caduta petali e uno a scamicatura.

*oppure*

Benefit PZ cc. 300+MC Cream cc. 150 Tre interventi a distanza di 10 gg. dall'inizio della scamicatura.

##### **Miglioramento della consistenza dei frutti e colore**

Alga Calcio cc. 250 Prodotto miscibile con lo zolfo



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Concimazione granulare

Eeguire una concimazione granulare con

Nitrocap ql. 1,5 per Ha oppure Multicrop 14-0-28 ql. 2,5-3/Ha

Impiegare il multicrop se non si è eseguita la concimazione potassica a caduta foglie. E' fondamentale intervenire in maniera tempestiva poiché in questa annata il periodo di tempo fra caduta petali ed indurimento nocciolo sarà molto breve.

### Pesco

#### Cidia Molesta

Installare gli erogatore della confusione sessuale a partire da inizio Aprile.

*oppure*

Check OFM F liquido cc. 50 per Ha, trattare appena possibile e ripetere ogni 14 gg., in caso di pioggia ripetere l'intervento dopo 7 gg. con dosaggio dimezzato.

#### Oidio

Domark 45EW cc. 90 oppure. Thiocur Forte/Systane cc. 150 oppure Microthiol gr. 300-350 Trattare a scamicatura.

#### Miridi

Trebon Star/Biensur cc. 100 Trattare a scamicatura

#### Eulia

Iniziato il volo, installare le trappole.

#### Forficole

Agri-col, pennellare il tronco. Intervenire a inizio fioritura.

#### Concimazione fogliare

Miglioramento pezzatura

BM 86 cc. 250 / HI Eeguire tre interventi fioritura, caduta petali e scamicatura.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Susino

#### Monilia e Cladosporium

Signum gr. 75 Trattare a scamicatura (fine settimana inizio prossima)

#### Afidi Tentredini

Confidor Oteq/Difloron cc. 50 Trattare a caduta petali

*oppure*

Epik gr. 100

#### Tripidi

Rufast cc. 60

#### Allegagione

Chaufer/Refer 15-20 Kg. /Ha + Actifert lt. 50 + Solubor/Boro L11 kg. 3

I prodotti a base di ferro durante l'epoca della fioritura limitano la fase di crisi post fiorale, favorendo una migliore allegagione.

#### Cidia Funebrana

Installare gli erogatore della confusione sessuale a partire da inizio Aprile.

#### Concimazione fogliare

Miglioramento pezzatura

BM 86 cc. 250 / Hl Eseguire tre interventi fioritura, caduta petali e scamicatura.

### Pero

#### Ticchiolatura

Silfur 80 gr. 180, Delan gr 100 per le varietà William e Kaiser

Intervenire entro le 24 ore dalla pioggia infettante, mantenere comunque la copertura ogni 4-5 gg.

cercando di prevenire le piogge, se non si riesce ad intervenire preventivamente, o entro le 24-36 ore dall'inizio della pioggia infettante, aggiungere **Bogard/Score o similari** cc. 15.

#### Maculatura

Switch gr. 80 oppure Rovral FL cc. 300 Trattare a caduta petali, il Rovral FL è fitotossico su decana, entrambi i prodotti sono efficaci anche su marciume calicino.

#### Tentredini

Epik gr. 100 Trattare a caduta petali.

#### Eriofide

Pride cc. 75 Trattare dove non è stato eseguito Polithiol a rottura gemme.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### **Psilla-Eriofide**

Dynamec/Zamir cc. 70+Eko Oil cc. 100

*oppure*

Dynamec/Zamir cc. 70+Break Thru/Tegoplant cc. 30

Attenzione evitare l'impiego di Eko Oil, dove si è impiegato TMTD da meno di 8-10 giorni.

### **Ricamatori**

Steward gr. 16,5 oppure Avaunt cc. 33 oppure Prodigy gr. 40 Ove non si è trattato in prefioritura trattare a caduta petali.

### **Concimazione fogliare**

Trattare a caduta petali.

### **Miglioramento allegagione**

Boro elle 11 cc. 150

*oppure*

Solubor gr. 100

+

Solugro 12-48-8/Magnusplant 12-48-8/Nutrient Express 4-41-27 gr. 200

Trattare a caduta petali

### **Prevenzione clorosi ferrica (concimazione fogliare)**

DL 6 cc. 150 oppure Librel FE gr. 50 oppure Ferrochelato L6 cc. 200 oppure Fertileader cc. 200

utilizzare su tutte le varietà, tranne Decana. Questa pratica non risolve totalmente il problema ma va ad integrare gli interventi radicali.

### **Prevenzione della clorosi ferrica applicazione radicale**

Chaufeur/Refer 15-20 Kg. /Ha + Actifert lt. 50 + Solubor/Boro L11 kg. 3

Occorre affrettarsi nella applicazione di questi fertilizzanti per evitare l'insorgenza di clorosi in fioritura.

## **Melo**

### **Ticchiolatura**

Delan/Gladior/Dithiaman gr. 100

Intervenire entro le 24 ore dalla pioggia infettante, mantenere comunque la copertura ogni 4-5 gg.

cercando di prevenire le piogge, se non si riesce ad intervenire preventivamente, o entro le 24-36 ore dall'inizio della pioggia infettante, aggiungere Score o similari cc. 15.

### **Oidio**

Topas 20 EW cc. 20+Thiopron cc. 300 oppure Thiocur forte/Systeme 4,5 Plus cc. 125-150+Thiopron cc. 300

### **Afidi**

Confidor Oteq/Difloron cc. 50 Trattare a caduta petali



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### **Miglioramento allegagione**

Boro elle 11 cc. 150

*oppure*

Solubor gr. 100

+

Solugro 12-48-8/Magnusplant 12-48-8/Nutrient Express 4-41-27 gr. 200

### **Carpocapsa**

Montare gli erogatori per la confusione sessuale.

### **Vite**

#### **Peronospora**

Penncozeb gr. 200 oppure Poliram gr. 200 Trattare con vegetazione di 5-7 cm eseguire il trattamento in preventivo sulle piogge. (Orintativamente eseguire il primo intervento il 21-22 Aprile)

#### **Oidio**

Karathane Star cc. 50 oppure Prosper cc. 130 trattare nelle zone ad alto rischio e in impianti che nell'anno precedente sono stati colpiti dal patogeno.

#### **Ragnetto, con Azione collaterale su Eriofide**

Dynamec/Zamir cc. 50+Break-Thru/Tegoplant cc. 30 Ove non trattato con Polithiol o Vernoil.

*oppure*

Mitrus/Slaon cc. 90-10 Prodotto non ammesso nei disciplinari di produzione.

#### **Tignola di prima generazione**

Iniziato il volo di prima generazione, installare i feromoni della confusione sessuale.

#### **Diserbo**

Chikara gr. 75+Stomp Aquaflo lt. 2+Roundup Bioflow lt. 2

Per Ha trattato. Intervenire su viti con età superiore ai tre anni.

#### **Viti di due anni**

Basta lt 4-5

#### **Viti di un anno**

Reglone lt. 3-3,5+Gallery lt. 0,750+Kerb flo lt. 1,5 per ha trattato.

### **Diserbo Piante da frutto**

#### **Diserbo piante adulte**

Roundup bioflow lt. 2-3/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5/2/Ha

Intervenire con piante da 4 anni in Avanti.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### **Diserbo piante di due anni**

Basta lt. 4-5/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5-2/Ha

### **Diserbo impianti primo anno**

Reglone lt. 3-4+Gallery lt. 0,750+kerb flo lt. 1,5 (solo melo e vite).

### **Kaki**

#### **Sesia**

Nemasys 1/Optinem Cydia. 1 Confezione da 1,5 miliardi per Ha eseguire il trattamento in un giorno piovoso con 20 hl di acqua per Ha, togliere i filtri dall'atomizzatore.

### **Actinidia**

#### **Prevenzione Batteriosi**

Intervenire in preventivo con induttori di resistenza

Chitoplant gr. 100/Hl

*oppure*

Kytex gr. 400/Hl+Sarplant gr. 50

Eseguire da due a tre interventi a turni di 10-12 giorni.

**Patentini:** Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Grano

**Fase Fenologica: levata**

#### Concimazione

Nitrocap 33,5-0-0 ql. 1,5-2

#### Diserbo

##### Dicotiledoni Comuni

Granstar 50 SX gr. 20+Trend cc. 500

##### Galium

Starane 21/Marins lt. 0,7-1 Aggiungere in caso di presenza

##### Veccia, Ricacci di medica, Cyrsium

Diclopir lt. 0,7-1 Aggiungere in presenza di queste infestanti.

##### Dicotiledoni e Galium

Manta Duo lt. 1,50

##### Graminici

Avena, Alopecuro, Poa

Topik 80 cc. 750 oppure Gralit Max lt 1,5

#### Difesa

##### Septoria

Agorà lt. 0,6-1 oppure Amistar xtra lt. 0,6-1

I grani più colpiti da septoria sono tutti i grani bianchi tra i quali Apoteosi, Geronimo, Mieti, A416, Nobel, e i grani duri, Latinur, Levante, Orobol, S. Carlo, fra i grani rossi Artico, Kalango, Quality, mentre le varietà Bologna e Bolero si presentano ad oggi esenti da sintomi. I sintomi risultano più evidenti nei grani seminati precocemente, entro il 20-25 Ottobre.

### Cipolla

#### Diserbo post-emergenza

Cipotril/Iotril cc. 150-200

+

Activus/Penthium lt. 0,5

Con cipolla alla fase di emergenza-frusta.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Cipolla autunnale

#### Peronospora

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha

#### Diserbo

Terminal/Fuego cc. 100-150/ha

+

Activus/Penthium lt. 1/Ha

#### Graminacee

Agil lt. 1

### Bietola Portaseme

#### Diserbo post-emergenza

1° intervento

Betanal expert lt. 1,5-2

+

Razor kg. 1-1,5

+

Pyramin FL lt. 0,7-1

+

Venzar gr. 100-150

+

Olio Bianco lt. 0,3-0,6

Cuscuta

Kerb Flo lt. 1 Trattare in presenza dell'infestante.

Amni majus e ombrellifere

Diclopyr lt. 0,7

Cleono

Kendo zeon cc. 125/ha

### Barbabetola da zucchero

#### Diserbo post-emergenza

Betanal expert lt. 0,700-1

+

Razor Kg. 0,700

+



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

Venzar gr. 50-100

+

Eko Oil lt. 0,300-0,500

In caso di presenza di amni majus utilizzare Safari gr. 40 al posto di venzar; con Safari utilizzare l'olio a cc. 300

### **Cuscuta**

Kerb Flo lt. 0,5-0,7 Trattare in presenza dell'infestante.

Cleono

Kendo zeon cc. 125/ha

### **Pisello**

#### **Diserbo pre-emergenza**

Activus/Pentium lt. 2

+

Challenge/Valzer lt. 1-1,5

Diserbo di post emergenza

Altorex lt. 0,500

+

Basagran SG kg. 0,4-0,600

### **Graminacee**

Agil lt. 0,6-1



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Diserbo letti di semina

Roundup Bioflow lt. 3-5 per Ha

+

Erbifast lt. 2-4

### Girasole

#### Geodisinfestante

Force/Micronol T5 kg. 10 /Ha

#### Diserbo Pre emergenza

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 2

*oppure*

Dual gold lt. 0,7-1

+

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 1,5

*oppure*

Terminal/Fuego lt. 0,5-0,6

+

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 1,5

Miscela valida in presenza di Amni Majus.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Mais

#### Geodisinfestante

Force/Micronol T5 Kg. 10-12

*oppure*

Zelig GR kg. 10-12

#### Diserbo di Pre-Emergenza

Bolero Micromix lt. 3,5-4

*oppure*

Primagram gold lt. 4-4,5

*oppure*

Primagram gold lt. 3,5

+

Merlin expert lt. 07-1

Miscela valida in presenza di Amnj majus e Abutylon.

### Sorgo

#### Geodisinfestante

Force/Micronol T5 kg. 10-12

#### Pre-emergenza

Non esiste attualmente nessun diserbato registrato, utilizzabile in pre-emergenza.

#### Post emergenza precoce

Primagram gold lt. 3 ha.

### Pomodoro

#### Diserbo di Pre-Trapianto

Most micro lt. 1,3-1,5

+

Mesozin kg. 0,5

+

Ronstar lt. 0,8-1

+

Dual gold lt. 0,4-0,5 Impiegare in caso di forti infestazioni di giavone

Eseguire il diserbato almeno 8 giorni prima del trapianto.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Concimazione

3-15-0 lt. 120-150 Localizzato al trapianto.

### Patata

#### Disinfestante pre ricalzatura

Force kg. 10 per Ha

#### Diserbo Post-ricalzatura

Activus/Penthium lt. 2

+

Challenge/Valzer lt. 1,5-1,8

+

Feinzin/Mesozin kg. 0,40-0,50

+

Command cc. 180-200

### Soia

#### Diserbo di pre-emergenza

Dual Gold lt. 0,7-1

+

Afalon/Linuron Sipcam lt. 0,7-1

+

Activus/Penthium lt. 1,5

Medica all'Impianto

#### Diserbo di post-emergenza

Altorex lt. 0,5-0,750

+

Malerbane prati lt. 1,5 Attenzione prodotto estremamente volatile pericoloso per piante arboree e pomodoro.

**Patentini:** Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.